

METODO DI CONTROLLO VARROA (RIASSUNTO DELLA NOSTRA ESPERIENZA)

ANNI dal 2000 al 2006

- un solo blocco di covata di 4 settimane:
- ingabbiamento regina nella prima decade di settembre
- trattamento dopo 24 giorni ai primi di ottobre
- liberazione regina al 28° giorno.

Numero di varroe per alveare cadute al primo giorno: circa 2000* - 3000*.

ANNO 2007 (annata particolare, inverno 06-07 mite, primavera anticipata, eseguito 2 blocchi covata)

1° blocco di covata di 24 giorni:

- ingabbiamento regina 8 luglio **lasciando il melario per eventuale raccolto e togliendo l'escludi regina, evitando così di restringerle troppo nel momento più caldo dell'anno.**
- Prima del trattamento levato il melario.
- liberazione regine e trattamento nello stesso momento al 1° agosto dopo 24 giorni dall'ingabbiamento.

Trattamento con acido ossalico gocciolato (soluzione 100gr oss./1000 gr zucchero/un litro d'acqua) dose 5 cc per favo coperto d'api, gocciolato per più di metà sulle stecche porta favo e il resto sulle api. (ossalico distribuito gocciolando di traverso rispetto ai favi)

alveare N° varroe cadute dal primo giorno al dodicesimo giorno

N°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
3	1500*	414	75	29	13	5	4	0	1	2	0	0
5	1670	247	72	34	17	10	4	2	1	1	2	0
6	1800*	600*	66	50	57	31	17	11	9	10	2	2
7	1400*	350*	38	24	22	9	6	0	2	3	2	0
8	1800*	600*	47	34	27	12	8	9	3	2	2	0
10	1100*	----	----	----	332	64	24	12	16	11	3	2

2° blocco covata di quattro settimane:

- Ingabbiamento regina 1 ottobre
- trattamento 25 ottobre
- liberazione regine 29 ottobre

Trattamento con acido ossalico gocciolato (soluzione 100 gr oss./1000 gr zucchero / un litro d'acqua), dose 5 cc per favo coperto d'api, gocciolato per più di metà sulle stecche porta favo e il resto sulle api. (ossalico distribuito gocciolando di traverso rispetto ai favi)

alveare N° varroe cadute dal primo giorno all'undicesimo giorno

N°	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
3	207	137	33	21	1	----	----	2	----	2	0	----
5	775	278	20	7	1	----	----	0	----	1	0	----
6	337	292	44	16	2	----	----	2	----	0	0	----
7	260	308	146	76	10	----	----	4	----	1	1	----
8	116	186	96	62	16	----	----	12	----	5	2	----
10	359	356	104	55	11	----	----	14	----	1	4	----

* numero varroe approssimate

---- giorni varroe non contate

Prendendo in considerazione l'alveare N° 5, con 1670 varroe cadute al 1° giorno, con un totale di caduta al 12° giorno di 2060 varroe (si considera che la varroa raddoppia di mese in mese), valutando che per circa 2/3 del mese di luglio la varroa non ha potuto moltiplicarsi a causa del blocco della deposizione con ingabbiamento regina, possiamo approssimare il numero di varroe possibilmente raggiunto al primo agosto: $(2060:3 \times 2) = 1373$, sommiamo $2060 + 1373 = 3433$ varroe (numero di varroe oltre il quale il mese successivo si rischierebbe il collasso dell'alveare). I 2 ingabbiamenti uno breve in luglio, uno più lungo di pulizia a fine stagione in ottobre, mi ha permesso di sanificare le api.

NOTA: confrontando gli anni precedenti dal 2000 al 2006 con il 2007, si nota che la varroa quest'anno ha raggiunto più o meno lo stesso numero 2 mesi prima, se avessi aspettato un mese in più nell'intervenire, gli alveari potevano essere compromessi.

Il metodo adottato nel 2007 e nei successivi anni 2021 compreso, **prevede due blocchi di covata**. Momento d'ingabbiamento estivo della regina nei giorni tra il 10 e il 15 luglio, per un periodo d'ingabbiamento di 24 giorni.

Momento d'ingabbiamento autunnale della regina nei giorni tra il 5 e il 15 ottobre, per un periodo d'ingabbiamento di 28 giorni.

I risultati ottenuti sono ottimi: varroa contenuta a bassi numeri per tutto l'anno.

Quando ho ingabbiato:

- **in Luglio un ingabbiamento regina** subito dopo i raccolti, quando le api hanno raggiunto il massimo sviluppo. Da questo momento in poi, a causa del caldo e della scarsità di raccolto, le api diminuiscono l'allevamento di covata. E' il momento opportuno per intervenire con l'ingabbiamento regina. Poi in assenza totale di covata applico un trattamento contro la varroa di sicura efficacia nei primi giorni di Agosto.

Non si deve aspettare ad ingabbiare ad Agosto inoltrato, la varroa può aver raggiunto alti numeri e di conseguenza la covata presente può essere fortemente infestata e non darà più api sane per fare proseguire l'alveare, che così crollerà, quando le api nate fra Maggio, Giugno e Luglio, diventate adulte, spariscono per fine ciclo di vita;

- **in autunno (Ottobre), un mese prima del glomere, un ingabbiamento regina, metto tutti gli alveari dell'apiario, nello stesso momento ed il prima possibile, in assenza certa di covata** e in grado di poter ricevere il trattamento di pulizia da varroa molto presto, nei primi giorni di novembre e non a Dicembre o a Gennaio, quando la varroa avrà fatto danni irreparabili.

Le api da Novembre in poi sono quasi ferme come attività e anche nell'allevamento covata, allevano sì covata se le temperature sono buone ma è sempre una piccola quantità, che non ci forma l'alveare anzi, su questa poca covata sarà concentrata la varroa, le api nascenti saranno debilitate e non in grado di sfarfallare da sole. Le api avranno fatto un lavoro inutile di allevamento covata e inoltre per noi ci saranno difficoltà per pulirle dalla varroa a fine stagione.

Conclusione: contenimento varroa a bassi numeri per mantenere in salute l'alveare.

Riassumendo queste due pagine, **trattamenti mirati in assenza totale di covata mediante ingabbiamento della regina**, condizione ideale per abbattere la varroa:

- uno estivo di abbattimento del picco di crescita della varroa in modo da evitare i danni che questa comporta ad alti numeri, ma **attenzione:** siamo ancora in stagione attiva per le api di conseguenza si hanno reinfestazioni;
- uno autunnale di pulizia a fine stagione, di facile applicazione in quanto l'alveare non è più affollato di api, fatto quando le api si stanno ritirando in casa e non c'è più il pericolo di reinfestazione tra apiari vuoti per fuchi o per saccheggi, lo considero essenziale per un buon proseguimento per l'anno successivo, specialmente per le zone dove le api prolungano l'allevamento di covata o non smettono mai, l'assenza totale di covata programmata mediante l'ingabbiamento della regina, consente di abbattere bene la varroa, di mantenere le api sane, si evita di ripetere più volte i trattamenti i quali vanno ad indebolire le api stesse.

Per le date di ingabbiamento e successivo trattamento, ogni apicoltore le adatterà in base al clima della propria zona.

Risultato di questo metodo confermatomi anche da apicoltori che l'hanno adottato:

- alveari di anno in anno ricchi di api
- api sane in autunno e in grado di passare bene l'inverno
- ripresa primaverile ottima
- ottima anche la produzione di miele.